

# Meloxifin Gel

Uso Veterinario

**Antiinflamatorio no esteroideo con vitamina E para equinos.  
Acción antiinflamatoria duradera.  
Sin complicaciones gástricas.**

## Fórmula:

Cada 100 g contiene:  
Meloxicam ..... 4,50 g  
Vitamina E\* ..... 7,50 g  
Vehículo c.s.p. .... 100,00 g  
\*Vit E: Acetato de dl alfa tocoferol.

## Indicaciones de uso:

**Meloxifin Gel** es un antiinflamatorio no esteroideo, con actividad inhibidora selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX 2), indicado en los siguientes procesos inflamatorios de los equinos:

- Patologías del aparato locomotor y enfermedades músculo-esqueléticas, como: miositis, tendinitis, osteitis, artritis, artritis reumatoides, osteoartritis, osteoartrosis, sinovitis, distensiones miotendinosas, traumatismos, claudicaciones, síndrome del navicular, laminitis y

auxiliar en la reparación de fracturas.

- Afecciones oculares: uveítis, conjuntivitis, pos operatorio.
- Desordenes de orden reproductiva como retención de placenta
- Metritis y mastitis
- Analgesia pre y pos operatoria
- Auxiliar en el tratamiento de infecciones bacterianas o crónicas (neumonías y diarrea) y cuadros febriles.

## Modo de uso y dosificación:

**Meloxifin Gel** debe ser administrado una vez al día (a cada 24 horas), vía oral, de acuerdo con la graduación de la jeringa. La jeringa es graduada para 5 días de tratamiento para animales adultos. Para potros administrar mitad de la dosis (mitad de una graduación de la jeringa).



**D: Dosis    J: Animales jóvenes (potros)    A: Animales Adultos**

**Dosis para equinos**  
(equinos, asnos y mulares)

**0,27 g de Meloxicam para cada 450 kg de peso corporal.**

(0,6 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)

**0,45 g de vitamina E para cada 450 kg de peso corporal.**

(1 mg de vitamina E por kg de peso corporal)

## Duración del tratamiento:

La duración promedio del tratamiento es de 5 días o deberá ser estipulada de

acuerdo con la gravedad del cuadro clínico y tipo de afección a ser tratada. En las patologías crónicas pueden ser necesarios tratamientos prolongados por un período de hasta 14 días o a criterio del médico veterinario.

#### **Interacciones medicamentosas:**

No administrar juntamente con otros anti-inflamatorios. Se recomienda un período de 24 horas de intervalo entre un tratamiento y otro, o de acuerdo con la farmacocinética de la droga anteriormente utilizada.

No administrar juntamente con antibióticos del grupo de los aminoglucósidos.

No administrar juntamente con agentes anticoagulantes como la warfarina y la aspirina.

No administrar con aminoglucósidos y neurotóxicos

#### **Contraindicaciones y limitaciones de uso:**

No administrar en animales con disturbios cardíacos, hepáticos o renales severos.

No administrar en animales con ulceración gastrointestinal o que presentaren desórdenes hemorrágicos o hipersensibilidad al producto.

Evitar la administración en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos.

#### **Precauciones:**

Obedecer a la dosis y vía de administración indicada para el uso del producto.

El tratamiento de animales idosos o con menos de 06 semanas de edad debe ser acompañado por médico veterinario.

#### **Efectos adversos:**

Pueden ocurrir reacciones generales como disminución del appetite, diarrea,

melena y apatía. Estas reacciones son generalmente transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o fin del tratamiento.

#### **Informaciones para uso médico:**

El meloxicam es un antiinflamatorio no esteroidal de la familia de los oxicans y no posee antídoto específico. En el caso de intoxicaciones, realizar el tratamiento sintomático.

#### **Tiempo de retiro:**

No administrar este producto en equinos para consumo humano.

**Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, protegido de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.**

**Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica.**

#### **Responsable Técnica:**

Sandra Barioni Toma  
(CRMV/SP 14.817)

Reg.: SAGARPA Q-7750-082



#### **Elaborado por:**

**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofinosaudeanimal.com  
Hecho en Brasil

#### **Importado y distribuido por:**

**OURO FINO DE MÉXICO S.A. DE C.V**  
Av. Guadalupe, #5134 Int. B, Colonia  
Jardines de Guadalupe - Zapopan,  
Jalisco, México CP. 45030 -  
Tel.: (52) 01 33 3620-3812