

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:
 Cloruro de Benzalconio 15,00 g
 Vehículo c.s.p. 100,00 mL

Indicaciones:

Herbalvet T.A. es indicado como desinfectante (bactericida, fungicida y protozoocida) y desodorizante con propiedad tensoactiva biodegradable y no corrosiva, para clínicas veterinarias, hospitales veterinarios, perreras, criaderos, en la limpieza y desinfección de pisos, paredes, sala de baño y esquila, mesas de alimentación y de cirugías e instrumentos quirúrgicos.

El producto posee acción efectiva contra las siguientes bacterias: *Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis*, *Staphylococcus aureus* y *Pseudomonas aeruginosa* y contra los siguientes hongos: *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus niger*. También actúa en la inactivación de quistes de *Giardia* spp.

Farmacodinámica:

La sustancia Cloruro de Benzalconio es clasificada como surfactante catiónico. Es un compuesto químico que disminuye la tensión superficial de una solución acuosa, facilitando su penetración en superficies húmedas; forma emulsiones con las secreciones sebáceas conteniendo micro bacterias, lo que facilita la remoción de suciedades y micro bacterias con el proceso de lavado; remueve del área contaminada las células epiteliales de descamación, manchas y grasas.

Dosis y Modo De Uso:

Para una correcta desinfección es recomendada la remoción mecánica de toda la suciedad, seguida de lavado con agua y jabón; en seguida enjuagar para retirar todo residuo de jabón y dejar secar. Solamente después de limpio y seco es que se recomienda la aplicación del desinfectante.

Herbalvet T.A. debe ser diluido en agua limpia, en la dosis de 1 mL del producto para 500 mL de agua, es decir, 10 mL en 5 litros de agua y aplicado o pulverizado en pisos, paredes, mesas, perreras y criaderos. Para láminas de esquila e instrumentos quirúrgicos, lavar y enjuagar las piezas y dejarlas inmersas en la solución del producto durante 20 minutos. Retirar las piezas y secarlas totalmente. En caso de láminas de esquila, realizar una lubricación tras el secado. No necesita enjuague, pues el producto no es corrosivo.

Cuando el producto es utilizado para inactivación de quistes de *Giardia* spp., también puede ser realizada la siguiente dilución: 1 mL del producto para 700 mL de agua, es decir, 10 mL en 7 litros de agua.

Precauciones:

Obedecer el modo de uso y diluciones preconizadas, Evitar el contacto del producto con la piel y con los ojos, pues podrá

causar irritación en el local. Si esto ocurre, lavar con agua abundante por 15 minutos. Si la irritación persistir, busque auxilio médico, llevando el embalaje del producto.

No mezclar con otros productos. No ingerir. En caso de ingestión accidental, no provocar vómito. Procure ayuda médica inmediata, llevando el embalaje del producto.

No aplicar sobre personas, alimentos y animales. Utilizar EPI adecuado (gafas, guantes, mascarara y ropa de protección, como botas y mandil de PVC) durante la manipulación y aplicación del producto.

Producto tóxico para peces, no tirar en ríos, lagos y otros cursos de agua. Los animales solo deben retornar a las instalaciones después que estas estuvieren totalmente secas.

No utilizar producto con el plazo de caducidad vencido. No reutilizar embalajes vacíos. Después de abierto, utilizar en 06 meses. Tras la dilución de 1:500, utilizar el producto en hasta 24 horas. Tras la dilución de 1:700, utilizar el producto inmediatamente.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No utilizar el producto puro, pues en contacto con la piel y mucosas del hombre y animales puede causar irritaciones. No usar junto con jabones y detergentes, pues los mismos disminuyen la actividad del desinfectante.

Reacciones adversas:

El producto es seguro para aplicación en el ambiente, conforme indicaciones y modo de usar preconizados. Sin embargo, informes de literatura apuntan la ocurrencia de reacciones adversas, cuando en contacto directo con el hombre.

Hay posibilidad de reacciones alérgicas en individuos hipersensibles a los componentes del producto. En concentraciones más elevadas, leves a graves quemaduras causticas pueden ocurrir en los labios, lengua, boca, faringe, hipo faringe, esófago y estómago.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica.

Responsable Técnica:

Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Importado y distribuido por:

México: Reg. SAGARPA 0-7750-076 - Ouro Fino de México S.A. de C.V. - JuGuadalupe, #5134 Int. B, Colonia Jardines de Guadalupe - Zapopan, Jalisco, México CP. 45030 - Tel: (52) 01 33 3620-3812.

Nº de lote:

Fecha de

fabricación:

Fecha de

vencimiento:

5000627/0916 OF00

**Elaborado por:**

Ourofino Saúde Animal Ltda.
 Rod. Anhanguera SP 330 Km. 298
 CEP 14140 000 Cravinhos SP
 Tel/Fax: 55 14 3518 2025
 CNPJ: 57.624.462/0001-05
 www.ourofino.saudeanimal.com
 Hecho en Brasil