

# Celesporin Comprimidos 600 mg

Uso Veterinario

Antibiótico bactericida de amplio espectro a base de Cefalexina.

## Composición:

Cada comprimido de 1000 mg contiene:  
Cefalexina (monohidrato) .. 600 mg  
Excipiente c.s.p. .... 1000 mg

## Indicaciones:

**Celesporin Comprimidos 600 mg** es una Cefalexina, antibiótico cefalosporínico de amplia acción, indicado en el tratamiento de las siguientes infecciones que acometen a los perros y gatos:

**Profilaxis de las infecciones de la piel de origen traumática o quirúrgica.**

**Profilaxis en el pre y postoperatorio.**

## Infecciones de la piel específicas:

Piodermitis superficiales, piodermitis profundas, impétigo, celulitis juvenil y foliculitis bacterianas causadas por *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*, *S. intermedius*, *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp, *Pasteurella multocida* y *Proteus mirabilis*.

## Otitis:

*Proteus mirabilis*, *Staphylococcus intermedius*, *Escherichia coli* y *Corynebacterium* spp.

## Infecciones urinarias:

Nefritis y cistitis causadas por *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp y *Proteus mirabilis*.

Infecciones respiratorias:

Neumonías causadas por *Escherichia coli*, *Klebsiella*

*pneumoniae* y *Staphylococcus* spp.

## Infecciones del aparato

### locomotor:

Artritis sépticas, osteomielitis y discoespondilitis causadas por *Staphylococcus* spp, *Pasteurella* spp, *Proteus mirabilis* y *Escherichia coli*.

## Modo de uso y dosificaciones:

**Celesporin Comprimidos 600 mg** se debe administrar por vía oral, en la dosificación de 1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal, es decir, 30 mg de Cefalexina por kg de peso corporal, de 12 en 12 horas o a criterio del médico veterinario. La dosificación, así como la duración y el intervalo de tratamiento se podrán ajustar de acuerdo con el tipo y la gravedad de la infección, bajo orientación del médico veterinario. En infecciones más suaves se recomienda el tratamiento durante 07 días. En los cuadros más severos pueden ser necesarios hasta 30 días de tratamiento, o a criterio del médico veterinario.

Los comprimidos se pueden administrar junto con una pequeña porción de alimento.

Recomendamos la continuidad del tratamiento por hasta 48 horas tras el desaparecimiento del cuadro clínico.

## Interacciones medicamentosas:

Cuando se administra conjuntamente con la furosemida, puede ocurrir el aumento de la

nefrotoxicidad de la Cefalexina. Cuando se asocia a anticoagulantes orales, puede ocurrir una trombocitopenia. Cuando se asocia a macrólidos, puede ocurrir una inhibición del efecto bactericida de la Cefalexina. Cuando se asocia a la probenicida, puede ocurrir el aumento de los niveles séricos y de la media vida de la Cefalexina.

Pueden ocurrir antagonismos cuando se asocia la Cefalexina a la penicilina o tetraciclina.

### **Contraindicaciones y limitaciones de uso:**

No lo administre a animales que posean historial de hipersensibilidad a las cefalosporinas.

Úselo con cuidado en animales hipersensibles a otros antibióticos beta-lactámicos (penicilinas, cefamicinas, carbapenes).

No administre Cefalexina vía oral a animales con septicemia, choque u otra enfermedad grave que disminuya la absorción del medicamento por el trato gastrointestinal.

En animales con insuficiencia renal, la dosis se debe reducir y el tratamiento lo debe seguir el médico veterinario.

### **Precauciones:**

Obedezca las dosificaciones recomendadas para el uso del producto.

Utilícelo solamente con seguimiento médico veterinario, en perras y gatas preñadas o en fase de amamentación.

### **Reacciones adversas:**

Las reacciones adversas relacionadas con las cefalosporinas ocurren raramente y, en su mayoría,

están relacionadas a la hipersensibilidad, desapareciendo con la interrupción del tratamiento. Raramente se observan trastornos gastrointestinales con la administración oral de la Cefalexina, como náuseas, vómitos y diarrea, que se pueden evitar con la administración de la droga con una pequeña cantidad de alimento.

**Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.**

**Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica.**

### **Responsable Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

### **Importado y distribuido por:**

**México:** Q-7750-050

Ouro Fino de México S.A de C.V – Av. Guadalupe, #5134 Int. B, Colonia Jardines de Guadalupe – Zapopan, Jalisco, México CP. 45030 – Tel.: (52) 01 33 3620-3812

### **Elaborado por:**

**Ipanema Indústria de Produtos Veterinários LTDA**  
Rod. Raposo Tavares, km 113, Caixa 611,  
Bairro Barreiro, Araçoiaba da Serra, SP  
CEP: 18.190-000  
CNPJ: 64.687.015/0001-52  
Hecho en Brasil

### **Para:**

**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330, km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
www.ourofinosaudeanimal.com  
Hecho en Brasil