

# Meloxifin 0,2% Solución Inyectable

Uso Veterinario

Antiinflamatorio no esteroide.

Acción antiinflamatoria más potente y duradera,  
sin complicaciones gástricas.

## Fórmula:

Cada 100 mL contienen:

Meloxicam ..... 0,200 g

Vehículo c.b.p. .... 100,0 mL

## Indicaciones:

**Meloxifin 0,2%** es un antiinflamatorio no esteroide con actividad inhibidora selectiva de la cicloxigenasa-2 (COX-2), que confiere un doble beneficio terapéutico, resultando en excelente actividad antiinflamatoria, analgésica y antiexsudativa con mínimos efectos gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de esos efectos, Meloxicam inhibe aunque la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y previene la destrucción ósea y cartilaginosa que ocurre en los procesos de inflamación degenerativa del sistema

locomotor.

**Meloxifin 0,2%** es indicado en procesos inflamatorios de perros, tales como:

- Patologías dolorosas o degenerativas, agudas o crónicas, del sistema osteomioarticular: osteítis, artritis, artritis reumatoides, osteoartritis, espondilosis, espondiloartrosis anquilosantes, displasias coxofemorales, calcificación de discos intervertebrales, reparación de fracturas, traumatismos y postoperatorio de artroplastias.
- Afecciones oculares: uveítis, conjuntivitis, postoperatorios.
- Desordenes de orden reproductiva como retención de placenta.
- Metritis y mastitis.
- Analgesia pre y postoperatoria.

## Modo de Uso y Dosis:

Dosis para Perros

|  |  |
|--|--|
| Primer día de tratamiento              | 1,0 mL para cada 10 kg de peso corporal<br>(0,2 mg de Meloxicam por kg de peso corporal) |
| Segundo día de tratamiento en adelante | 0,5 mL para cada 10 kg de peso corporal<br>(0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal) |

**Meloxifin 0,2%** debe ser administrado una vez al día, o a cada 24 horas por las vías subcutánea, intramuscular o intravenosa.

## Duración del tratamiento:

La duración del tratamiento deberá ser estipulada de acuerdo con la gravedad

del cuadro clínico y tipo de afección a ser tratada. Se recomienda hasta dos aplicaciones consecutivas. En las patologías crónicas de los perros pueden ser necesarios tratamientos prolongados por un período de hasta 28 días o a criterio del médico veterinario. En estos

casos se recomienda la continuidad del tratamiento con **Meloxicam (Comprimidos 0,5 mg)** o **Meloxicam (Comprimidos 2 mg)**.

#### Interacciones medicamentosas:

No administrar juntamente con otros antiinflamatorios esteroides o no esteroides o tras el uso de esas drogas. Se recomienda un período de 24 horas de intervalo entre un tratamiento y otro, o de acuerdo con la farmacocinética de la droga anteriormente utilizada. No administrar juntamente con antibióticos del grupo de los aminoglucósidos (estreptomina, neomicina, gentamicina y kanamicina). No administrar juntamente con agentes anticoagulantes como la warfarina y la aspirina.

#### Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar en animales con disturbios cardíacos, hepáticos o renales severos. No administrar en animales con posible ulceración gastrointestinal o que presenten evidencia de desórdenes hemorrágicos o hipersensibilidad al producto. Evitar la administración en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos en razón del riesgo de toxicidad renal ser potencializado. La seguridad del medicamento no fue establecida en perras preñadas.

#### Precauciones:

Obedecer la dosis y vías de administración indicadas para el uso del producto utilizando normas de asepsia propias para aplicación parenteral. El tratamiento de animales ancianos o con menos de 06 semanas de edad debe ser cuidadosamente acompañado por el médico veterinario, siendo en algunos casos, necesario reducir la dosis a ser administrada.

#### Reacciones adversas:

Pueden ocurrir reacciones generales como disminución del apetite, vómito, diarrea, melena y apatía. Estas reacciones son generalmente transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o fin del tratamiento.

#### Informaciones para uso médico:

El Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroide de la familia de los oxicam y no posee antídoto específico. En caso de intoxicaciones, realizar tratamiento sintomático.

**Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.**

**Consulte al médico veterinario.  
Su venta requiere receta médica.**

#### Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

#### Registros:

**México:** Reg. Q-7750-080 – Ouro Fino de México S.A de C.V – Av. Guadalupe, #5134 Int. B, Colonia Jardines de Guadalupe - Zapopan, Jalisco, México CP. 45030 - Tel.: (52) 01 33 3620-3812

#### Elaborado por:

**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330, km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNP J: 57.624.462/0001-05  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
www.ourofino.saudeanimal.com  
Hecho en Brasil

