

Uso Veterinario

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

IMPACTO

PULVERIZACIÓN

cipermetrina + clorpirifos

Insecticida pecuario
Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

	% P/V
Cipermetrina: (RS)- α -ciano-3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 150.0 g de i.a./L a 20°C)	15
Clorpirifos: O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato (Equivalente a 250.0 g de i.a./L a 20°C)	25

INGREDIENTES INERTES:

Surfactante y solvente	60
TOTAL	100



MORTAL SI SE INHALA

Reg. N° RSCO-MEZC-PEC-1116-X0001-009-040

 **ourofino**
salud animal

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente la etiqueta. No almacene este producto en casa habitación. No aspirar partículas pulverizadas. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto: ropa impermeable, botas, anteojos de protección, mascarilla y guantes. Báñese después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES".
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
"NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA".

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación a un lugar ventilado y manténela en reposo en una posición que no dificulte la respiración. Consiga atención médica de inmediato y muéstrela la etiqueta al médico. No induzca al vómito a menos que se lo indique el médico. No de ningún líquido a la persona. No administre nada por la boca si la persona esté inconsciente. En caso de contacto con los ojos mantenga el ojo u ojos abiertos, enjuague con agua lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos y llame al médico. En caso de contacto con la piel o ropa, quítese la ropa contaminada, enjuague de inmediato la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos y llame al médico.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Clorpirifos; organofosforado. **Cipmetrina:** piretroide.
Tratamiento y antidoto: Atropina: administrada por medio de la vía intravenosa, hasta lograr atropinización leve. Adulto: 2 a 5 mg cada 10-15 minutos; niños: 0.05 mg/kg cada 10-15 minutos. La atropinización puede ser necesaria por horas hasta días dependiendo de la severidad. Vitamina E: la aplicación de vitamina E tópica es eficaz para aliviar la irritación cutánea. **Pralidoxima:** Realizar administración de pralidoxima asociada con la atropina en caso de intoxicación moderada o severa. Los resultados del tratamiento pueden ser observados en 48 horas. El tratamiento puede ser necesario por varios días.

Signos y síntomas de Intoxicación:

Por vía oral: puede causar vómitos y náuseas. Por vía dermal: provoca irritación moderada en la piel.

Por vía inhalatoria: puede causar temblores musculares, contracción de pupilas y respiración forzada.

Por vía ocular: puede causar lagrimeado constante. La exposición repetida o prolongada provoca daños al sistema nervioso central con mareo, dolor de cabeza, convulsiones e inconsciencia. Todos los síntomas y señales son colinérgicos en naturaleza y afecta a los receptores muscarínicos, nicotínicos y del sistema nervioso central. Para confirmar el envenenamiento deberán tomarse muestras sanguíneas para medir la actividad colinesterásica plasmática y los niveles de AChE en los glóbulos rojos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EN CASO DE DERRAMADO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)".

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

GARANTÍA DEL PRODUCTO POR EL FABRICANTE:

Ouro Fino de México, S.A. de C.V., garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable, expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo, transporte, almacenamiento y uso de este producto está fuera de nuestro control.

"INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

IMPACTO PULVERIZACIÓN está indicado para el tratamiento estratégico y control de garrapatas en bovinos (carne y leche).

PLAGAS QUE CONTROLA

Nombre común	Nombre científico
Garrapata	<i>Boophilus microplus</i>

Método de aplicación del producto:

Diluir 25 mL de producto en 20 L de agua, aplicando 5 L de mezcla por animal. Homogenizar la mezcla y rociar los animales con pulverizador de bomba en todo el cuerpo. Incluyendo las orejas del animal, axilas, la ingle, la inserción de la cola y toda la parte inferior del animal; dejándolo completamente mojado. Aplicar el spray en la dirección contraria al crecimiento del pelo.

El tratamiento es de dosis única.

Periodo de retiro:

No destinar al consumo humano la carne de animales tratados antes de transcurridos 16 días de la última aplicación del producto. No destinar al consumo humano la leche de animales tratados antes de transcurridas 52 horas de la última aplicación del producto.

Contraindicaciones:

No usar en animales estresados, enfermos o convalecientes. No usar en la piel lesionada. No usar en animales con hipersensibilidad conocida a los compuestos del producto. No aplicar el producto en horas de intenso calor o días de lluvia.

Reg. N° RSCO-MEZC-PEC-1116-X0001-009-040

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Ouro Fino de México S.A de C.V

Av. Guadalupe, #5134 Int. B,
Colonia Jardines de Guadalupe
Zapopan, Jalisco, México CP. 45030
Tel.: (52) 01 33 3620-3812

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguru SP 330 km 298
CEP 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil