

Ricofino 10 Inyectable

Solución Inyectable

Uso Veterinario

Composición:

Cada 100 mL contiene:
Sulfóxido de Albendazol . 10,00 g
Excipientes c.s.p. 100,00 mL

Indicaciones:

Ricofino 10 Inyectable es un antihelmíntico de amplio espectro de acción, con acentuada acción en la esterilización de los huevos, y en el combate de las formas adultas e inmaduras de los siguientes Nemátodos, Céstodos y Tremátodos que parasitan a los bovinos:

Nemátodos gastrointestinales:

Haemonchus spp, *Ostertagia* spp (incluyendo la larva en Hipobiosis *Ostertagia* tipo II),
Trichostrongylus spp, *Cooperia* spp, *Nematodirus* spp,
Oesophagostomum spp, *Trichuris* spp, *Chabertia* spp, *Strongyloides*

spp, *Bunostomum* spp.

Nemátodo pulmonar:

Dictyocaulus viviparus.

Céstodos:

Moniezia spp.

Tremátodo:

Fasciola hepatica forma adulta.

Dosis y Modo de Uso:

Ricofino 10 Inyectable debe ser aplicado por vía subcutánea, en dosis única, con el auxilio de una pistola dosificadora, a las siguientes dosis:

Nemátodos y Céstodos:

La dosificación indicada es de 2,5 mg de Sulfóxido de Albendazol por kg de peso corporal. O sea, 1 mL para cada 40 kg de peso, por vía subcutánea.

Ostertagiosis Tipo II:

La dosificación indicada es de 3,75 mg de Sulfóxido de Albendazol por kg de peso

Tabla de dosificación:

Peso corporal	Nemátodos y Céstodos	Ostertagiosis Tipo II	<i>Fasciola hepatica</i>
40 kg	1,0 mL	1,5 mL	2,0 mL
80 kg	2,0 mL	3,0 mL	4,0 mL
120 kg	3,0 mL	4,5 mL	6,0 mL
200 kg	5,0 mL	7,5 mL	10,0 mL
320 kg	8,0 mL	12,0 mL	16,0 mL
400 kg	10,0 mL	15,0 mL	20,0 mL
500 kg	12,5 mL	18,75 mL	25,0 mL
	1 mL/40 kg	1,5 mL/40 kg	2 mL/40 kg

corporal, o sea, 1,5 mL para cada 40 kg de peso, por vía subcutánea.

Tremátodos:

La dosificación indicada es de 5,0 mg de Sulfóxido de Albendazol por kg de peso corporal, o sea, 2 mL para cada 40 kg de peso corporal, por vía subcutánea.

Contraindicaciones y limitaciones:

El producto solo debe ser administrado en bovinos. Este producto debe ser administrado únicamente por vía subcutánea, preferiblemente en la región conocida como "tabla del cuello".

Efectos adversos:

El producto no presenta efectos adversos cuando se respetan las indicaciones y dosificaciones recomendadas para su uso.

Precauciones:

- Seguir la indicación de dosis para el uso del producto.
- Dosis superiores a 10 mL deben ser divididas en dos o más lugares de aplicación.
- Utilizar agujas adecuadas para la aplicación subcutánea y jeringas estériles.
- Los envases deben ser enterrados o quemados.
- Conserve las buenas prácticas de asepsia durante todo el proceso de aplicación del producto.
- No utilizar en hembras preñadas durante los primeros 45 días de gestación.

Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 5 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

Conservar en local seco y fresco, entre 5°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Responsable Técnica:

Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.814

Registros:

Colombia: Reg. ICA 5432-DB

Honduras: Reg. PF 3162

México: Reg. S.A.G.A.R.P.A.
Q-7750-021

Panamá: Reg. RF - 3804 - 17

Paraguay: Reg. S.E.N.A.C.S.A.
5252



Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rod. Anhanguera SP 330 km 298

CEP: 14140 000 Cravinhos SP

Tel/Fax: 55 16 3518 2025

CNPJ: 57.624.462/0001-05

www.ourofino.saudeanimal.com

Hecho en Brasil