

Sincrodiol

Uso Veterinario

Solución Inyectable

Estrógeno Inyectable

Composición:

Cada 100,00 mL contiene:

Benzoato de

Estradiol 100,00 mg

Excipiente c.s.p. 100,00 mL

Indicaciones:

Sincrodiol (Benzoato de Estradiol) tiene una amplia utilización en la medicina veterinaria cuando se necesita reproducir el efecto de sustancias estrógenas naturales. Es indicado para:

BOVINOS Y BUBALINOS:

- Protocolos reproductivos de inseminación artificial: en la sincronización de las ondas foliculares, ovulación del folículo dominante e inducción de celo.
- Coadyuvante en la sensibilización del músculo liso a la oxitocina para facilitar su acción en el tratamiento de retención placentaria, expulsión de fetos momificados y material purulento en casos de piómetra abierta, hemorragia y atonía uterinas.

- Anestro.

EQUINOS:

- Promover contracción uterina e inducción de celo.

- Anestro.

Modo de uso y dosificación:

BOVINOS Y BUBALINOS:

1) Protocolos reproductivos

En el día de la inserción de implantes de progestágenos:

administre 2,0 mL por vía intramuscular para provocar atresia del folículo dominante y una nueva onda de crecimiento folicular.

Después de 1 a 2 días de la retirada del implante, administre 1,0 a 2,0 mL, por vía intramuscular, para estimular la liberación de hormona luteinizante y ovulación.

2) Para contracción uterina, para expulsión de pus, placenta o fetos momificados, hemorragias y atonías uterinas: administre 2,0 a 5,0 mL, por vía intramuscular.

3) Para corrección de anestro: administre 2,0 mL por vía intramuscular o subcutánea.

EQUINOS:

1) Para inducción del celo, promoción de la contracción

uterina y corrección de anestro:
administre 1,5 a 3,0 mL, por vía
intramuscular.

Precauciones:

Obedezca las dosificaciones
recomendadas para el uso del
producto.
Use agujas y jeringas
esterilizadas, observando las
buenas prácticas de asepsia.
Úselo con cautela en animales
con problemas hepáticos debido a
la disminución de la capacidad de
metabolizar los estrógenos.
No lo administre a animales
jóvenes, sexualmente inmaduros.
La respuesta al uso de hormonas,
con la finalidad de sincronización
del celo, depende del buen estado
corporal en que el animal se
encuentra y de la ausencia de
enfermedades reproductivas
infectocontagiosas y desórdenes
endócrinos que conlleven a
disminución de la fertilidad.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administre el producto a
animales preñados.
No use medicamentos con el
plazo de validez vencido.
No lo use en animales que
presenten hipersensibilidad a
cualquiera de los componentes
del producto.

Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben

**sacrificarse para consumo
humano hasta 7 días después de
finalizado el tratamiento. La
leche producida durante el
tratamiento y 0 horas después de
finalizado el mismo no debe
darse al consumo humano.
No administrar este producto en
equinos para consumo humano.**

Condiciones de almacenamiento y conservación:

Conserve el producto en su
envase original, en un lugar seco
y fresco, en temperatura
ambiente (entre 15°C a 30°C), y
protegido de la luz solar directa.
Manténgase fuera del alcance de
los niños y animales domésticos.

**Su venta requiere receta médica
cuantificada. Para uso exclusivo
del médico veterinario.**

Responsable Técnica:

Sandra Barioni Toma CRMV/SP
14.817

Registro:

México: Reg. SAGARPA Q-7750-055



Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil