

Iver Dual Gel

Uso Veterinario

Gel de uso oral

Composición:

Cada jeringa de 9,6 g contiene:

Ivermectina	0,12 g
Prazicuantel	1,50 g
Vitamina E	0,60 g
Excipientes c.s.p.	9,60 g

Indicaciones:

IVER DUAL GEL es indicado en el tratamiento y control de los parásitos de los equinos como:

Nematodos

gastrointestinales:

Habronema spp,
Trichostrongylus axei,
Parascaris equorum,
Strongyloides westeri,
Oxyuris equi, *Onchocerca*
spp

Grandes estróngilos:

Triodontophorus spp,
Strongylus vulgaris,
Strongylus equinus,
Strongylus edentatus

Pequeños strongylideos

Cyathostominae:

Cyathostomum spp,
Gyalocephalus spp,

Cylicodontophorus spp,
Cylicostephanus spp,
Cylicocyclus spp

Nematodo pulmonar:

Dictyocaulus arnfieldi.

Cestodos: *Anoplocephala*
spp, *Equinia mamillana*,
Anoplocephala perfoliata.

Larvas de moscas:

Gasterophilus nasalis.

Habronemosis: *Habronema*
spp, *Draschia* spp y sus
larvas.

Modo de uso y dosificación:

IVER DUAL GEL debe ser administrado por vía oral solamente en equinos. Cada signo en el émbolo de la jeringa (1,6 g) suministra gel suficiente para tratar 100 kg de masa corporal; es decir, 20 mg de Ivermectina, 250 mg de prazicuantel y 100 mg de Vitamina E por kilo de peso corporal; una jeringa es suficiente para tratar un caballo de 600 kg. Antes de

la administración, asegúrese que el caballo no tiene comida en la boca. Ponga la jeringa en la boca y deposite el gel sobre la lengua. Mantenga la cabeza del caballo para arriba durante algunos segundos tras la dosificación. Administrar en dosis única.

Precauciones:

No tirar los envases vacíos en ríos o lagunas. El producto es tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar comer o fumar al administrar el producto.

Condiciones de almacenamiento y conservación:

Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa, en temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS.

Interacción medicamentosa:

La dexametasona disminuye la eficacia del prazicuantel.

Reacciones adversas:

El producto no tiene

reacciones adversas cuando se aplica de acuerdo con las instrucciones.

Tiempo de Retiro:

No administrar este producto en equinos para consumo humano.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Responsable Técnica:

Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Registros:

Bolivia: SENASAG Reg. PUV – N.º 1114/06

Guatemala: Reg. BR211-104-01-1131

México: Q-7750-058

Nicaragua: 7594

Paraguay: Reg. SENACSA N° 8155

Perú: Reg. SENASA F.09.75.1.0362

Venezuela: Reg. INSAI2041PI33N076599

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil