

# Dermolene<sup>®</sup> Crema

Uso Veterinario

## Crema Dermatológica

### Composición:

Cada 100 g contiene:

Gentamicina (Sulfato)\* ..... 200,00 mg

Miconazol (Nitrato)\*\* ..... 2.000,00 mg

Betametasona

(Valerato)\*\*\* ..... 82,35 mg

Excipientes c.s.p. .... 100,00 g

\*Equivalente a 340,00 mg de Sulfato de Gentamicina.

\*\*Equivalente a 2.300,00 mg de Nitrato de Miconazol.

\*\*\*Equivalente a 100,00 mg de Valerato de Betametasona.

### Indicaciones:

**Dermolene Crema** es un agente antibacteriano, antifúngico y antiinflamatorio de uso tópico para afecciones cutáneas que acometen a los perros y gatos.

#### Uso en perros:

Dermatitis Húmeda Aguda:

*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Proteus* spp, *Pseudomonas* spp, *Corynebacterium* spp, *Escherichia coli*.

Piodermitis de Doblez Cutánea:

*Staphylococcus* spp, *Proteus* spp, *Pseudomonas* spp, *Corynebacterium* spp.

Piodermitis Superficiales, Impetigo:

*Staphylococcus intermedius*,

Foliculitis Profunda: *Pseudomonas*

spp, *Proteus* spp, *Escherichia coli*;

Furunculosis: *Pseudomonas* spp,

*Proteus* spp, *Escherichia coli*;

Piodermitis Superficiales y Profundas

Recurrentes: *Staphylococcus* spp,

*Proteus* spp, *Pseudomonas* spp,

*Corynebacterium* spp, *Escherichia*

*coli*.

Dermatofitosis: *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum*, *Mallassezia pachydermatis*, *Trichophyton mentagrophytes*.

**Dermolene Crema** es indicado para el tratamiento auxiliar de las lesiones cutáneas de varias etiologías, como: DAPP (Dermatitis Alérgica por Pulgas), Complejo Pénfigo, Penfigoide Buloso, Lupus Eritematoso, Dermatitis de Contacto Irritativa, Picaduras de Insectos, Quemaduras, Ulceración por el Frio, Úlceras de Decúbito, Protección de las heridas quirúrgicas.

#### Uso en gatos:

Piodermitis Superficiales y Profundas

Recurrentes: *Staphylococcus* spp,

*Proteus* spp, *Pseudomonas* spp,

*Corynebacterium* spp, *Escherichia*

*coli*.

**Dermolene Crema** es indicado para el tratamiento auxiliar de las lesiones cutáneas de varias etiologías, tales como: Micobacteriosis Atípicas, Dermatitis Irritante de Contacto, DAPP (Dermatitis Alérgica por Pulgas), Hipersensibilidad Alimentaria, Dermatitis Inmunomediadas, Picaduras de Insectos, Quemaduras, Úlceras de Decúbito, Protección de las heridas quirúrgicas.

Dermatofitosis: *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum*, *Trichophyton mentagrophytes*;

### Dosis y modo de usar:

**Dermolene Crema** es un producto para administración tópica sobre las lesiones de la piel, debiendo ser

aplicado sobre toda la extensión del área que será tratada, de manera que se forme una capa fina del producto sobre la lesión cutánea.

**Dermolene Crema** debe ser aplicado dos o tres veces al día, durante siete a diez días, para el tratamiento de lesiones cutáneas, excepto las de origen fúngico.

Para el tratamiento de patologías fúngicas, el tiempo de tratamiento deberá extenderse por hasta cuatro semanas.

En todos los casos, el tratamiento deberá ser continuado hasta 48 horas después del desaparecimiento del cuadro clínico.

### Precauciones:

No utilizar medicamentos con fecha de validez vencida.

Se recomienda cortar el pelo y limpiar el área que será tratada antes de la aplicación del producto, principalmente en las lesiones de origen fúngico.

Recomendamos atención especial en el tratamiento de animales con grandes áreas de piel desnuda o quemaduras graves, pues podrá absorber una fracción mayor del medicamento.

No reutilizar los envases. Los restos del producto y del envase deben ser eliminados como recomienda la legislación vigente, evitando la contaminación del medio ambiente.

No desechar en ríos ni lagos.

### Contraindicaciones y limitaciones:

**Dermolene Crema** está contraindicado para animales que presentan hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

### Interacciones medicamentosas:

La Gentamicina es inactivada por la administración concomitante de carbenicilina.

No administrar el producto

concomitantemente con relajantes músculoesquelético, una vez que aumenta la posibilidad de bloqueo neuromuscular.

No administrar el producto concomitantemente con furosemida o anfotericina B, una vez que aumenta la posibilidad de ototoxicidad y nefrotoxicidad.

### Reacciones adversas:

Existe la posibilidad de reacciones alérgicas a la Gentamicina, al Valerato de Betametasona y al Miconazol cuando los animales son hipersensibles a uno de estos componentes.

Puede ocurrir ototoxicidad en tratamientos prolongados, pero la reversión de esos cuadros generalmente ocurre después de la suspensión del tratamiento.

**Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.**

**Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica.**

### Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

### Registro:

**Mexico:** Q-7750-072

### Importado y distribuido por:

Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México

### Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.  
Rod. Anhanguera SP 330, km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
www.ourofino.saudeanimal.com  
Hecho en Brasil