

# Otogen

Uso Veterinario

Gel otológico.

## Composición:

Cada 100 g contiene:

Gentamicina (Sulfato) .....	300,00 mg
Dipropionato de Betametasona .....	122,00 mg
Miconazol .....	1000,00 mg
Excipientes c.s.p. ....	100,00 g

## Indicaciones:

**Otogen** es indicado para perros, en el tratamiento de otitis aguda y/o crónica, de etiología bacteriana y/o fúngica, sensibles a la acción de la Gentamicina y del Miconazol.

## Agentes etiológicos susceptibles:

### Bacterias:

*Staphylococcus intermedius*,  
*Staphylococcus aureus*,  
*Staphylococcus spp*,  
*Streptococcus spp*, *Streptococcus pyogenes*, *Proteus mirabilis*,  
*Proteus vulgaris*, *Proteus spp*,  
*Pseudomonas aeruginosa*,  
*Escherichia coli*, *Corynebacterium spp*.

### Hongos:

*Mallassezia pachydermatis*  
(*Pityrosporum canis*),  
*Epidermophyton floccosum*,  
*Microsporum canis*, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Candida spp*.

## Dosis y modo de usar:

**Otogen** es un producto para uso tópico y debe ser aplicado en el interior del canal auditivo externo, de acuerdo a la orientación que figura a continuación:  
Para perros con peso corporal hasta 15 kg, deben ser administradas 4 gotas del producto, 2 veces al día (intervalos de 12 horas).  
Para perros con peso corporal de 15 kg o más deben ser administradas 8 gotas del producto, 2 veces al día (intervalos de 12 horas).

Peso corporal	Dosis	Frecuencia y duración del tratamiento
Hasta 15 kg	4 gotas	2 veces al día durante 7 a 9 días
15 kg o más	8 gotas	

**Otogen** debe ser administrado durante 7 a 9 días consecutivos, o a criterio del médico veterinario. Recomendamos la continuidad del tratamiento por hasta 48 horas después del desaparecimiento del cuadro clínico.

## Precauciones:

Antes de la aplicación del producto, recomendamos la

limpieza total del oído externo, removiendo todas las suciedades y cuerpos extraños, utilizando un producto específico.

Después de la aplicación de **Otogen**, se debe masajear el lugar cuidadosamente para que haya una buena distribución del producto en el oído externo. La administración de **Otogen**, a partir del séptimo día de tratamiento, debe ser supervisado una vez que el uso excesivo del producto puede retardar la cicatrización de las lesiones oriundas de la otitis.

### **Contraindicaciones y limitaciones:**

No administrar **Otogen** en otitis en la que la infección bacteriana o fúngica es causada por agentes que no son sensibles al producto.

### **Interacciones medicamentosas:**

La Gentamicina es inactivada por la administración concomitante de Carbenicilina.

No administrar el producto concomitantemente con relajantes músculoesqueléticos, una vez que aumenta la posibilidad de bloqueos neuromuscular.

No administrar el producto concomitantemente con furosemida o anfotericina B, una vez que aumenta la posibilidad de ototoxicidad y nefrotoxicidad.

### **Reacciones adversas:**

Existe la posibilidad de reacciones alérgicas a la Gentamicina, al Dipropionato de Betametasona y al Miconazol cuando los animales

son hipersensibles a uno de estos componentes.

Puede ocurrir ototoxicidad en tratamientos prolongados, sin embargo la reversión de esos cuadros generalmente ocurre después de la suspensión del tratamiento.

**Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.**

**Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica veterinaria.**

### **Responsable Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

### **Importado y distribuido por:**

**México:** Reg. Q-7750-078 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México

---

#### **Elaborado por:**

**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330, km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
[www.ourofino.saudeanimal.com](http://www.ourofino.saudeanimal.com)  
Hecho en Brasil