

Quinotrat Tabs (25 mg)

Uso Veterinario

Antibacteriano palatable a base de Enrofloxacin
para caninos y felinos

Fórmula:

Quinotrat Tabs (25 mg)

Cada comprimido palatable
contiene:

Enrofloxacin 25,00 mg
Excipiente c.s.p. .. 200,00 mg

Indicaciones:

Quinotrat Tabs (25 mg) es un
antibiótico a base de
Enrofloxacin en formulación
palatable. La Enrofloxacin
pertenece a la familia de las
fluoroquinolonas y se
destaca por su amplio
espectro de acción y por su
rápida absorción,
metabolización y
distribución.

Con acción bactericida,
Quinotrat Tabs (25 mg) es
indicado para el tratamiento

de infecciones que padecen
caninos y felinos, causadas
por *Escherichia coli*,
Pasteurella multocida,
Klebsiella pneumoniae,
además de la *Bordetella*
bronchiseptica en felinos.

Modo de uso:

Quinotrat Tabs (25 mg) debe
ser ofrecido al animal, de
acuerdo con la dosis
preconizada para su peso
corporal, directamente en la
mano del propietario o
juntamente con alimento o
ración, no habiendo
necesidad de ayuno previo
o cualquier alteración en la
dieta para su
administración.

Dosis:

La dosis terapéutica de la Enrofloxacin es de 5 mg/kg de
peso corporal debiendo ser administrada una vez al día por
tres a cinco días, o a criterio del médico veterinario.

Característica	Presentación	Dosis
Para caninos de talla pequeña y felinos	25 mg	1 tableta para 5 kg

Farmacodinámica:

La Enrofloxacin pertenece a la clase de las quinolonas, cuya actividad bactericida es atribuida a su habilidad de inhibir la DNA-girasa. Esta enzima, también conocida como topoisomerasa II, actúa en la mayoría de los procesos biológicos que comprometen el DNA, tales como transcripción, recombinación, replicación y reparación. La acción de la Enrofloxacin sobre la DNA-girasa pasará a través del relajamiento de las espirales del DNA que pasa entonces a ocupar un espacio mayor que el contenido en los límites del cuerpo bacteriano, llevando a la muerte celular.

Farmacocinética:

La Enrofloxacin es bien absorbida tras administración oral con picos de concentración sérica siendo alcanzados cerca de 2 horas tras su administración. Las quinolonas en general tienen una buena y rápida penetración en todos los tejidos, con un volumen de distribución variando entre 2

a 4 L/kg. Las mayores concentraciones son encontradas en la bilis, riñones, hígado, pulmones y sistema reproductivo (incluyendo tejido y fluido prostático). Niveles terapéuticos también son obtenidos en los huesos, fluido sinovial, piel, músculos, humor acuoso y fluido pleural. La metabolización se dará a través de oxidación microsomal al nivel del citocromo P-450 y de conjugación con el ácido glucurónico. La Enrofloxacin es des-etilada para formar la Ciprofloxacin, un metabolito activo con acción antimicrobiana en la mayoría de las especies. La Enrofloxacin es eliminada tanto por mecanismo renal cuanto no renal (hepático). Aproximadamente 15 a 50% de la droga es eliminada de forma inalterada por la orina, tanto por secreción tubular cuanto por filtración glomerular. Las rutas metabólicas comunes de este agente son la desalquilación, glucuronidación, oxidación, sulfoxidación, acetilación y

ruptura del anillo piperacínico. La media-vida de eliminación aproximada en caninos es de 4 a 5 horas y en felinos, 6 horas.

Precauciones:

Obedecer el modo de uso y dosis recomendadas. La administración en animales con insuficiencia renal o desórdenes hepáticos o cardíacas graves debe ser hecha con el acompañamiento del médico veterinario.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

Segundo estudios toxicológicos, la Enrofloxacin es contraindicada durante la fase de crecimiento rápido del animal (entre 2 y 8 meses de edad para caninos de razas pequeñas y medias; hasta 18 meses de edad para caninos de razas grandes). No es recomendado el uso en felinos con menos de 8 semanas de edad. La seguridad del producto no fue evaluada en caninos y felinos con menos de 2 años de edad y los informes sobre el uso de Enrofloxacin en

felinos en esta edad son limitados, lo que exige evaluación médica veterinaria criteriosa sobre la seguridad del tratamiento de animales de esta edad. No administrar en animales con historia de hipersensibilidad a la Enrofloxacin. No administrar en perras gestantes o en fase de lactancia.

Reacciones adversas:

Estudios clínicos de seguridad conducidos con el producto, en dosis de 5 mg/kg, una vez al día por 10 días, demostraron que el mismo es seguro. Sin embargo, informes de literatura apuntan que pueden ocurrir reacciones gastrointestinales como vómito y anorexia. En felinos, incidencias de toxicidad ocular han sido informadas con el uso de la Enrofloxacin en altas dosis, siendo caracterizada por midriasis, degeneración de la retina y ceguera.

Interacciones medicamentosas:

Soluciones que contengan hierro, aluminio, zinc,

manganeso y calcio reducen la absorción de la Enrofloxacin, cuando administradas concomitantemente a ella. La nitrofurantoína, el cloranfenicol y la rifamicina puede antagonizar la actividad antimicrobiana de las fluoroquinolonas, no siendo recomendado su uso concomitante. La Enrofloxacin administrada junto a la teofilina puede aumentar su concentración plasmática. La probenecida bloquea la secreción tubular de la Enrofloxacin pudiendo aumentar los niveles plasmáticos de la droga y su tiempo de media vida. La nefrotoxicidad causada por la ciclosporina de uso sistémico puede ser exacerbada cuando utilizada junto a las fluoroquinolonas. La administración concomitante con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) puede potencializar los efectos estimulantes del sistema nervioso central de las quinolonas.

Consérvelo en un lugar seco

**y fresco, entre 15°C y 30°C,
protegido de la luz solar
directa, fuera del alcance
de niños y animales
domésticos.**

**Consulte al médico
veterinario. Su venta
requiere receta médica.**

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508

Registros:

México: Q-7750-096

Importado y distribuido por:

Ouro Fino de México S.A de
C.V - Av. Real Acueducto No.
335, Int. 1204, Col. Real
Acueducto, C.P. 45116,
Zapopan, Jalisco, México

Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil



Mientras cuidamos de la salud animal, reimaginamos el planeta. Accede reimagina.ourofino.com y conoce nuestras iniciativas para garantizar el equilibrio sostenible de la salud animal y el bienestar del mundo.



ourofino
salud animal